

Fiche d'aide à l'identification

Les confusions possibles parmi les insectes piégés

Si vous imprimez cette page sur une feuille A4, les insectes seront en taille réelle. Plus d'informations et une fiche de signalement sur internet http://inpn.mnhn.fr

Le **frelon asiatique** à pattes jaunes, *Vespa velutina*, est à dominante noire, avec une large bande orange sur l'abdomen et un liseré jaune sur le premier segment. Sa tête vue de face est orange, et les pattes sont jaunes aux extrémités. Il mesure entre 17 et 32mm.

Le **frelon d'Europe**, *Vespa crabro*, a l'abdomen à dominante jaune clair, avec des bandes noires. Sa tête est jaune de face et rouge au dessus. Son thorax et ses pattes sont noirs et brun-rouges. Les ouvrières mesurent entre 18 et 23mm et les reines entre 25 et 35.

Les **guêpes** sont plus petites que les frelons. Les ouvrières mesurent environ 15mm en fin d'été. Attention, une reine de guêpe peut dépasser légèrement 20mm, c'est-à-dire la taille du frelon asiatique représenté ici sans la tête. Au printemps les guêpes peuvent donc être plus grande que les premières ouvrières de frelon.



Frelon asiatique à pattes jaunes, Vespa velutina var. nigrithorax





Frelon d'Europe, Vespa crabro



Guêpe des buissons, Dolichovespula media



Guêpe germanique, Vespula germanica



Guêpe poliste, Polistes biglumis

La **scolie** des jardins fait partie des plus imposantes "guêpes" européennes. Elle est de ce fait fréquemment confondue avec le frelon asiatique. Sa pilosité est très épaisse. Son corps est noir brillant, sa tête est jaune sur le dessus et elle possède 4 zones jaunes et glabres sur l'abdomen. C'est un parasite de larves de gros Coléoptères (comme le Hanneton).

Il y a environ 1000 espèces d'abeilles en France, seule l'abeille domestique et les bourdons vivent en société. Ils ont les tibias des pattes postérieures modifiés en corbeille. Les autres espèces sont solitaires (Megachile, Colletes, Halictes, Xylocope...) et les femelles ont

presque toutes les pattes élargies avec de longs poils, mais jamais de modification des pattes postérieures


aussi poussées que chez les abeilles sociales.



Détail de la patte postérieure d'Apis mellifera



Apis mellifera





Megachile,



Colletes. Megachile ericetorum Colletes succinctus



Xylocope ou abeille charpentière, Xylocopa violacea

De nombreuses mouches (Diptères) peuvent ressembler à des guêpes ou des frelons. Mais à la différence de ceux-ci elles ne possèdent qu'une seule paire d'ailes au lieu de deux. Leurs yeux sont généralement beaucoup plus globuleux et leurs antennes plus courtes.



Volucelle zonée, Volucella zonaria



Halictes.

Halictus rubicundus

Milésie faux-frelon, Milesia crabroniformis



Asile frelon, Asilus crabroniformis



